

Эндоскопические исследования под наркозом

Перед наркозом:

- Пройти обследование (ЭКГ, общеклинический анализ крови, уровень глюкозы).
- При необходимости врачом анестезиологом-реаниматологом могут быть назначены дополнительные лабораторно-инструментальные методы исследования с обоснованием необходимости назначений с целью исключения противопоказаний для проведения эндоскопического исследования или выбора анестезиологического пособия.
- Перед наркозом для взрослых и детей старше 6 лет — последний прием пищи не позднее, чем за 6 часов. Последний прием жидкости и препаратов для подготовки к исследованию не позднее, чем за 4 часа до назначенного срока исследования.
- В случае планового лечения какими-либо препаратами, обсудить с анестезиологом необходимость их приема в день исследования (возможна консультация по телефону).

Перед исследованием:

- Не наносить на лицо макияж.
- Снять все ювелирные украшения (часы, кольца, цепочки, серьги).
- Снять съемные зубные протезы и прочие съемные конструкции полости рта, если таковые имеются.
- При наличии контактных линз, предупредить об этом анестезиолога. Иметь при себе набор для контактных линз (контейнер, жидкость для промывания).

После наркоза:

- Прием жидкости не ранее чем через 30 мин после процедуры.
- Прием пищи не ранее чем через 2 часа, если нет иных указаний анестезиолога.
- Запрещается управлять транспортными средствами и пользоваться электроинструментом и выполнять прочие потенциально опасные работы, требующие повышенной концентрации внимания, в течение 24 часов после наркоза.
- После наркоза можно покинуть клинику, желательно, с сопровождающим, не ранее чем через 30 мин (обычно, через 1 час) после осмотра анестезиолога.